

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PODANIE TABLETEK JODU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Imię i nazwisko dziecka.....

Data urodzenia (wiek).....

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna.....

Stosownie zaznaczyć krzyżykiem

TAK, wyrażam zgodę na podanie mojemu dziecku tabletek jodku potasu i potwierdzam, że nie są mi znane żadne przeciwwskazania do przyjmowania tabletek jodku potasu przez moje dziecko.

NIE, nie wyrażam zgody.

.....
data

.....
podpis rodzica lub opiekuna

Informacje dla rodziców i opiekunów

Jodek potasu stosowany jest w przypadku katastrof nuklearnych lub uszkodzeń reaktorów jądrowych w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę. W trakcie uszkodzeń reaktorów jądrowych może dojść do emisji radioaktywnego jodu. W przypadku skażenia, radioaktywny jod wychwytywany jest przez tarczycę. Przyjęcie nie-radioaktywnego jodu (np. w postaci jodku potasu) zapobiega wychwytowi jodu radioaktywnego przez tarczycę przed lub po wystąpieniu skażenia.

JODEK POTASU ZOSTANIE PODANY JEDYNIEM W PRZYPADKU ZAGROŻENIA PO OGŁOSZENIU AKCJI JODOWEJ PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Sposób dawkowania:

Grupa ryzyka	Ilość stabilnego jodu	Liczba podawanych tabletek
Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc	12,5 mg jodu	¼ tabletki
Dzieci od miesiąca do 3 lat	25 mg jodu	½ tabletki
Dzieci od 3 do 12 lat	50 mg jodu	1 tabletki
Osoby od 12 do 60 roku życia	100 mg jodu	2 tabletki
Kobiety w ciąży i karmiące piersią (w każdym wieku)	100 mg jodu	2 tabletki

Przeciwwskazania - kiedy nie przyjmować leku:

- ✓ jeśli masz uczulenie na jodek potasu lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
- ✓ jeśli masz nadczynność tarczycy;
- ✓ jeśli masz zaburzenie naczyń krwionośnych (zapalenie naczyń z hipokomplementemią);
- ✓ jeśli masz choroby autoimmunologiczne połączone ze świądem i pęcherzami na skórze (opryszczkowate zapalenie skóry Duhringa).

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy;
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy;
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek;
- ✓ masz zaburzenia czynności nadnerczy i stosujesz leczenia z tym związane.

Pamiętaj! Przed przyjęciem leku zwróć się o poradę lekarza:

- ✓ w przypadku występowania złośliwego nowotworu tarczycy lub takiego podejrzenia;
- ✓ w przypadku zwężenia dróg oddechowych (powodującego trudności w oddychaniu).

Podanie leku preparatu ze stabilnym jodem może pogorszyć stan zdrowia jeśli:

- ✓ stosujesz lub stosowałeś w przeszłości leczenie chorób tarczycy;
- ✓ występuje nieleczona autonomia tarczycy;
- ✓ występuje zaburzenie czynności nerek;
- ✓ w przypadku zaburzenia czynności nadnerczy i leczenia z tym związanego.

**JEŚLI WYSTĄPIĄ JAKIEKOLWIEK OBJAWY NIEPOŻĄDANE ORAZ W PRZYPADKU
JAKICHKOLWIEK WATPLIWOŚCI SKONTAKTUJ SIĘ Z LEKARZEM LUB
FARMACEUTĄ**